

MICROBAN® 2%

MUPIROCINE

POMMADE APPLICATION LOCALE Tube de 15 g



e-notice

Scannez ce code pour lire la dernière version de la notice en ligne



1- Identification du médicament :

Composition qualitative et quantitative :

Chaque 100 g de MICROBAN® contient :

Substance active : Mupirocine.....2 g.

Excipients : Polyéthylène glycol 400, Polyéthylène glycol 4000.

Forme pharmaceutique et présentation :

Pommade / Tube de 15 g.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Antibiotique pour application locale.

2- Indications thérapeutiques :

MICROBAN® contient un antibiotique : la mupirocine. Elle permet de combattre les infections dues aux bactéries.

Ce médicament est utilisé pour traiter des infections de la peau dues à certaines bactéries (les staphylocoques et les streptocoques) et sur lesquelles la substance active (la mupirocine) a un effet.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant.

3- Informations nécessaires à connaître avant de prendre ce médicament :

Contre-indications :

Ne pas utiliser ce médicament en cas de :

- Si vous êtes allergique à la mupirocine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Pour traiter une infection des seins si vous allaitez.

Mise en garde et précautions d'emploi :

- Avant d'utiliser ce médicament, vous devez prévenir votre médecin si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale).

- N'appliquez pas cette pommade :

- Sur les yeux,
- À l'intérieur du nez,
- Sur une grande surface ou de manière prolongée sans l'avis de votre médecin.

Interactions médicamenteuses :

Vous devez éviter d'utiliser en même temps ou successivement d'autres pommades.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Ce médicament peut être utilisé au cours de l'allaitement.

N'utilisez jamais MICROBAN® pour traiter une infection des seins si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

4- Comment prendre ce médicament :

Mode d'emploi et posologie :

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 2 à 3 applications par jour d'une petite quantité de pommade.

- Ce médicament est réservé à l'usage local, il s'applique sur la peau.
- Après application de la pommade, vous pouvez recouvrir la zone traitée avec une gaze stérile ou avec un pansement imperméable à l'eau et à l'air (pansement occlusif).
- La pommade est sans odeur, s'enlève à l'eau et ne tache pas les habits.

Durée de traitement :

La durée du traitement est en règle générale de 5 à 10 jours.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de tout symptôme ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

5- Effets secondaires :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- Une allergie. Vous pourrez reconnaître une allergie par l'apparition de boutons, d'urticaire (éruptions de la peau ressemblant à une piqûre d'ortie), d'un brusque gonflement du

visage et du cou pouvant entraîner des difficultés à respirer. Si l'un de ces effets apparaît, vous devez immédiatement arrêter le traitement et contacter votre médecin.

- Des picotements et des brûlures à l'endroit où vous avez appliqué MICROBAN®.

6- Conservation :

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas conserver tout tube entamé au-delà de 15 jours.

7- Conditions de délivrance :

Liste I.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : 04/2021.

Fabricant, conditionneur et détenteur de la décision d'enregistrement :

Sarl ONYX Industrie Pharmaceutique.

Siège social : Cité La Caroube

Immeuble Belle Vue N°5 - Annaba - Algérie.

Usine : Z.A de Zerizer- El-Tarf - Algérie.

Décision d'enregistrement N° :

21/07 C 104/546



ميكروبان® 2%

مبيروسين

مرهم استعمال موضعي أنبوب يحتوي على 15 غ

1- التعرف بالذواء:

التركيب الكمي والنوعي:
كل 100 غ من ميكروبان® يحتوي على:
المادة الفعالة: مبيروسين.....2 غ.
السماعات: متعدد الإيثيلان غليكول 400، متعدد الإيثيلان غليكول 4000.

الشكل الصيدلاني والتقديم:
مرهم / أنبوب يحتوي على 15 غ.

التصنيف الصيدلي العلاجي:
مضاد حيوي للاستعمال الموضعي.

2- حالات الاستعمال:

يحتوي ميكروبان® على المضاد الحيوي: مبيروسين. يساعد على مكافحة العدوى التي تسببها البكتيريا. يستخدم هذا الدواء لعلاج التهابات الجلدية التي تسببها بعض البكتيريا (المكورات العنقودية والعقديات) والتي تؤثر عليها المادة الفعالة (مبيروسين). هذا الدواء موجه للبالغين والأطفال.

3- المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها قبل تناول هذا الدواء:

موانع الإستعمال:

لا يمكن إستعمال هذا الدواء في حالة:
إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المبيروسين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

لعلاج التهاب الثدي إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية.

تحذيرات وإحتياطات الإستعمال:

- قبل إستخدام هذا الدواء، يجب أن تخبر طبيبك إذا كان لديك مرض في الكلى (فشل كلوي).
- لا تطبق هذا المرهم:
• على العيون،
• داخل الأنف،
• على مساحة كبيرة أو لفترة طويلة دون إستشارة الطبيب.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

يجب تجنب إستخدام في نفس الوقت أو على التوالي مراهم أخرى.
أخبر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تأخذ، أو أخذت مؤخرا أو قد تأخذ أي دواء آخر.

الحمل والإرضاع:

الحمل:

لا يستخدم هذا الدواء أثناء الحمل إلا بناء على نصيحة طبيبك. إذا إكتشفت أنك حامل أثناء العلاج، إستشيري طبيبك لأنه هو من يستطيع الحكم على الحاجة في الإستمرار.
أطلب النصيحة من طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

الإرضاع:

يمكن إستخدام هذا الدواء أثناء الرضاعة الطبيعية.
لا تستخدمي ميكروبان® أبداً لعلاج عدوى الثدي إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية.
أطلب النصيحة من طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

4- كيفية إستعمال هذا الدواء:

طريقة الإستعمال والجرعة:

إستخدم هذا الدواء دائماً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلاني. تحقق مع طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت على شك.
الجرعة الموصى بها هي من 2 إلى 3 تطبيقات يوميا لكمية صغيرة من المرهم.
• هذا الدواء للإستخدام الموضعي فقط، يتم تطبيقه على الجلد.
• بعد تطبيق المرهم، يمكنك تغطية المنطقة المعالجة بشاش معقم أو ضمادة مقاومة للماء والهواء (ضمادة إنسدادية).
• المرهم عديم الرائحة، يزال بالماء ولا يلوث الملابس.

مدة الإستعمال:

مدة العلاج عادة ما تكون من 5 إلى 10 أيام.
لتكون فعالة، يجب إستخدام هذا المضاد الحيوي بانتظام حسب الجرعات الموصوفة، وللفترة التي نصحك بها الطبيب.
اختفاء أي أعراض لا يعني أنك شقيت تماما.

5- الآثار الجانبية:

مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء تأثيرات غير مرغوب فيها ولكن ليس حتماً عند كل الناس.
قد تحدث الآثار الجانبية التالية:
- حساسية: يمكن أن تتعرف على الحساسية عن طريق ظهور البثور، شرى (طفح جلدي ينسب لدغة نبات القراص)، تورم مفاجئ في الوجه والرقبة التي يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس. في حالة حدوث أي من هذه التأثيرات، يجب عليك التوقف فوراً عن العلاج والإتصال بالطبيب.
- وخز و حرق في منطقة تطبيق ميكروبان®.

6- الحفظ:

يترك بعيدا عن أنظار ومتناول الأطفال.
لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30° م.
لا تحتفظ بأي أنبوب مفتوح لأكثر من 15 يوماً.

7- شروط الإصدار:

القائمة ..

آخر تاريخ تم فيه مراجعة هذه النشرة: 2021/04.

المصنّع، المعبئ وصاحب مقرر التسجيل:

ش.ذ.م.م. أونيكس للصناعة الصيدلية.
المقر الإجتماعي: حي الخروبة
عمارة المنظر الجميل رقم 5 - عنابة - الجزائر.
المصنّع: منطقة النشاط زريزر
الطارف - الجزائر.

مقرر التسجيل رقم: 21/07 C 104/546

أونيكس